



FOSFODIP T.A[®]

Polvo soluble para mezclar con el agua de bebida o alimento
Fosfomicina al 50%

Composición Garantizada

Cada 100 g contiene:
Fosfomicina Cálcica.....50 g
Excipientes c.s.p.....100 g

INDICACIONES

FOSFODIP TA Se usa en aves para el control y tratamiento de enfermedades causadas por gérmenes como *Avibacterium paragallinarum*, *Escherichia coli*, *Pasteurella sp*, *Pasteurella multócida*, *Gallibacterium anatis* y *Staphylococcus sp* y otros sensibles al medicamento.

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Aves: 32 mg de Fosfomicina / kg de peso vivo durante 5 días consecutivos. En la práctica, disolver 0.5g de **FOSFODIP TA** por litro de agua. Mediar solamente el agua a usarse durante el día.

En el alimento mezclar la cantidad necesaria de **FOSFODIP TA** por tonelada de alimento, para lograr una adecuada medicación (tener en cuenta peso y consumo de alimento).

Cerdos: Solo medicar bajo criterio del Médico Veterinario.

CARACTERÍSTICAS

Absorción excepcional, el 97% de la Fosfomicina se absorbe a través del intestino.

Excelente difusibilidad, su alta solubilidad y bajo peso molecular otorgan una alta difusibilidad aún en abscesos y áreas de pobre vascularización.

Compatibilidad óptima, a la fecha, no se han encontrado casos de incompatibilidad entre Fosfomicina y otros productos farmacéuticos y/o aditivos alimenticios, que normalmente se utilizan en la industria pecuaria, y hace sinergismo con Timetroprim, Tetraciclina, Sulfaclopiridacina y colistina y se complementa con la Tilosina Tartrato.

Conservar en sitio fresco, seco y protegido de la luz solar directa.

Consulte al médico veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños.

REG. ICA No 9067 - MV

T.A LABORATORIOS LTDA, carrera 3 No. 1-49 bodega 20 Km 1 zona industrial
Chimitá, Girón – Santander. Tel. (7) 6760891 telefax (7) 6761648
correo electrónico gerencia@ta-laboratorios.co web www.ta-laboratorios.co

