



NORFLODIP - T.A[®]

FICHA TÉCNICO COMERCIAL



COMPOSICIÓN

Cada 100 ml de producto contiene:

Norfloxacina	20 g
Excipientes c.s.p	100 ml
(alcohol etílico, ácido acético, metilparabeno puro, propilparabeno, agua purificada)	


T.Alaboratorios[®]

PRODUCTO: NORFLODIP – T.A®

Solución oral para administrar en el agua de bebida
NORFLOXACINA AL 20 %

DESCRIPCIÓN

NORFLODIP - T.A® es un quimioterapéutico con actividad antimicrobiana sobre gérmenes gramnegativos, Gram positivos y Mycoplasmas, NORFLODIP - T.A® por su amplio espectro esta indicado para el tratamiento de las enfermedades bacterianas y micoplásmicas de las aves y porcinos, NORFLODIP - T.A® es un producto estable y confiable.

INDICACIONES

NORFLODIP - T.A® esta indicado en el tratamiento de los principales agentes productores de enfermedades que afectan.

EN AVES

En pollos de engorde, pollitas, pollonas, ponedoras, reproductoras y pavos para el tratamiento de enfermedades causadas por *Escherichia coli*, *Avibacterium paragallinarum*, *Pasteurella multócida*, *Salmonella sp*, *Gallibacterium anatis*, *Salmonella enteritidis*, *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma sinoviae*.

EN CERDOS

En porcinos para el tratamiento de enfermedades ocasionadas por *Escherichia coli*, *Proteus sp*, *Clostridium perfringens*, *Salmonella sp.*, *Pasteurella sp.*, *Bordetella sp.*, *Mycoplasma hyoneumoniae* y *Bordetella bronchiseptica*.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

NORFLODIP - T.A® se puede emplear en todas las fases de producción del pollo de engorde, en pollitas, pollonas y pavos. Se administra en el agua de bebida de las aves.

EN AVES

En aves administrar 10 a 20 mg / kilo de peso. En la práctica administrar 1 ml de NORFLODIP - T.A® por litros de agua, en el agua de todo el día, durante cinco días o según criterio del médico veterinario.

EN CERDOS

En porcinos administrar 25 mg por kilo de peso. En la práctica administrar de 1 a 2 ml de NORFLODIP - T.A® por cada litro de agua de bebida durante 3 a 5 días o según criterio del médico veterinario.

NORFLODIP - T.A® se puede suministrar simultáneamente con Bromhexina o productos para la terapia del dolor o estados febriles.

Orgullosamente Colombiano