

TILCODIP-TA[®]

FICHA TÉCNICO COMERCIAL

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml de producto contiene:

Tilmicosina Fosfato	30 g
Excipientes c.s.p	100 g
(Alcohol Bencílico, Propilenglicol, Sacarina sódica)	

T.A. Laboratorios[®]

PRODUCTO: TILCODIP-T.A®

TILMICOSINA al 30 %
Solución Oral para mezclar con el agua de bebida.

INDICACIONES

EN AVES

En pollos de engorde, para el control y tratamiento de infecciones respiratorias ocasionadas por *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Ornithobacterium rhinotracheale* y *Pasteurella multócida*.

- En aves reproductoras donde el huevo no va para consumo humano, se puede usar en cualquier etapa.
- En pollonas, en la fase de levante únicamente.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Administrar 15 – 20 mg de filmicosina / kg de peso vivo durante 3 días consecutivos. En la práctica disolver 0,25 ml de TILCODIP - T.A® por litro de agua. El agua medicada debe ser la única fuente de bebida.

VER, TRES OPCIONES DE TRATAMIENTO EN POLLO

OPCIÓN 1	DOSIS	DÍAS	TOTAL mg / POLLO	PARA 10.000 POLLOS	FRASCOS x 200 ml
	2 mg/pollo	3 (2,3,4 de edad)	6	60.000 mg	1
6mg/pollo de 0,4 k	1 Post-vacunal	6	60.000 mg	1	
OPCIÓN 2	DOSIS	DÍAS	TOTAL mg / POLLO	PARA 10.000 POLLOS	FRASCOS x 200 ml
	2 mg/pollo	3 (2,3,4 de edad)	6	60.000 mg	1
6mg/pollo de 0,4 k	2 Post-vacunal	12	120.000 mg	2	
OPCIÓN 3	DOSIS	DÍAS	TOTAL mg / POLLO	PARA 10.000 POLLOS	FRASCOS x 200 ml
	6 mg/pollo de 0,4 k	3 Post-vacunal	18	180.000 mg	3

EN POLLAS DE REEMPLAZO DONDE SE UTILIZA CEPA F

DOSIS	DÍAS	TOTAL mg / POLLITA	PARA 10.000 POLLITAS	FRASCOS x 200 ml
6 A 8 mg/pollita de 0,4k	3	18 a 24	180.000 mg a 240.000 mg	3 a 4

Esperar 8 días terminado el tratamiento para poner la cepa F. chequear las aves por PCR después de la semana 40 para certificar la presencia de la cepa F, si por alguna razón la cepa F no se encuentra o se halla mezclada con cepa de campo, se puede optar por choquear con TIAMUCLORDIP T.A® y volver a vacunar con cepa F o seguir el programa de choques cada 6 semanas con TIAMUCLORDIP T.A®. Si no se pone cepa F, hacer adicionalmente los choques en recepción con TILCODIP T.A® (2mg por pollita durante 3 días), y en la semana 12 (20 mg por kilo de peso vivo durante 3 días), continuar en producción los choques con TIAMUCLORDIP - T.A®

Orgullosamente Colombiano