

TIAMUCLOORDIP - TA[®]

FICHA TÉCNICO COMERCIAL



COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contiene:

Fumarato Hidrogenado de Tiamulina	10 g
Clortetraciclina HCL	30 g
Excipientes (Aerosil 200 y carbonato de calcio) c.s.p.	100 g

PRODUCTO: TIAMUCLORDIP - TA

TIAMUCLORDIP – T.A.® Es una combinación sinérgica de dos ingredientes: **Fumarato Hidrogenado de Tiamulina y la Clortetraciclina HCL**. Pre-mezcla antimicrobiana para administrar en el alimento en aves y cerdos para el control y tratamiento de los diferentes tipos de Mycoplasmas y bacterias Gram negativas.

INDICACIONES

EN AVES

TIAMUCLORDIP – T.A.® está indicado para el tratamiento de enfermedades causadas por gérmenes como *Mycoplasma spp*, *Escherichia coli*, *Avibacterium paragallinarum*, *Pasteurella multócida*, *Gallibacterium anatis*, *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma sinoviae* y otros gérmenes sensibles. Correspondientes al tratamiento de ERC y ERCC, coriza infecciosa y cólera aviar.

EN CERDOS

TIAMUCLORDIP – T.A.® indicado para el tratamiento de infecciones del aparato respiratorio y tracto digestivo producidas por: *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyorhinis*, *Pasteurella multócida*, *Actinobacillus pleuroneumoniae*, *Brachyspira hyodysenteriae*, y *pilosicoli*, *Lawsonia intracelularis*. Como ileitis, disentería porcina, colitis, pasteurellosis, rinitis atrófica, neumonía enzoótica porcina y pleuroneumonía porcina.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

EN AVES

Programa de control y tratamiento en medicación de 7 días cada 6 semanas en ponedoras y reproductoras, con el objeto de limpiar las aves de Mycoplasmas y bacterias Gram negativas, para mejorar el desempeño zootécnico de las aves.

Dosis Tratamiento: FHT 100 - 150 ppm (a esta dosis no es compatible con ionóforos), CTC 300 - 450 ppm equivalente a 1 – 1,5 Kg de TIAMUCLORDIP –T.A.® / Ton. de alimento.

EN CERDOS

Dosis preventiva durante periodos de riesgo: -Neumonía enzoótica porcina, pleuroneumonía porcina, pasteurellosis, rinitis atrófica, disentería porcina, ileitis, colitis FHT 30 – 50 ppm y CTC 90 –150 ppm equivalente a 300 – 500 g de TIAMUCLORDIP –T.A.® / Ton. de alimento.

DOSIS DE TRATAMIENTO EN CERDOS

Neumonía enzoótica porcina, pleuroneumonía porcina, pasteurellosis, rinitis atrófica: FHT 200 ppm + CTC 600 ppm, equivalente a 2 Kg. de TIAMUCLORDIP-TA.® / Tonelada de alimento por un periodo de 7- 10 días.

Disentería Porcina, ileitis, colitis: FHT 100 – 120 ppm y CTC 300 – 360 ppm, equivalente a 1 – 1,2 Kg de TIAMUCLORDIP – T.A.® / Ton. de alimento.

Orgullosamente Colombiano